

ΣΧΗΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 2017

ΗΛΙΚΙΑ ► ΕΜΒΟΛΙΟ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ ▼	2 Μηνών	3 Μηνών	4 Μηνών	5 Μηνών	6 Μηνών	7 Μηνών	8 Μηνών	12 Μηνών	13 Μηνών	15 Μηνών	18 Μηνών	20 Μηνών	24 Μηνών	30 Μηνών	4-6 Ετών	11-12 Ετών	12-14 Ετών	
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β	Hep B ¹		Hep B		Hep B		Hep B											
ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ ΙΝΦΛ.	H I B ²		H I B		H I B													
ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ ΑΚΥΤ. ΚΟΚΚΥΤΗΣ ΤΕΤΑΝΟΣ	D T a P ³		D T a P		D T a P													
ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ	I P V ⁴		I P V		I P V													
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ	PCV ⁵		PCV		PCV		P C V											
ΡΟΤΑΙΟΣ	ROTA ⁶	ROTA	ROTA															
ΜΗΝΙΓΓΙΤΟΚΟΚΚΟΣ Β	MEN B ⁷		MEN B		MEN B		MEN B											
ΜΗΝΙΓΓΙΤΟΚΟΚΚΟΣ A,C,W135,Y								MEN 4 ⁸									MEN 4	
ΙΛΑΡΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ ΕΡΥΘΡΑ								MMR ⁹ or MMR-V ¹⁰					M M R or MMR-V					
ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ								VARICELLA ¹¹					VARICELLA					
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α								Hep. A ¹²		Hep. A		Hep A						
ΙΟΣ ΑΝΘΡ. ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ																		HPV ¹³
ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ	INFL ¹⁴																	

Σημείωση



Το ελλειπτικό σχήμα υποδηλώνει την ηλικία που συνιστάται η έναρξη χορήγησης των εμβολίων σε περίπτωση που δεν έχουν χορηγηθεί προηγουμένως